

## **Versionsgeschichte der medizinischen Empfehlungen für substituionsgestützte Behandlungen (SGB) bei Opioidabhängigkeit**

### **Versionsupdate von Version 25.05.07 auf Version 19.06.07**

S. 28, Kapitel 8.1:

#### Alter Text:

- ☞ Auch bei einer bestehenden Hepatitis C ist eine Hepatitis A Impfung zu empfehlen [C].
- ☞ Bei allen Patienten mit chronischen pulmonalen Erkrankungen oder/und solchen, die mit dem HI-Virus infiziert sind, ist eine einmalige Impfung gegen Pneumokokken ratsam [C].

#### Neuer Text:

- ☞ Auch bei einer bestehenden Hepatitis C ist eine Hepatitis A und B Impfung zu empfehlen [C].
- ☞ Bei allen Patienten mit chronischen pulmonalen Erkrankungen oder/und solchen, die mit dem HI-Virus infiziert sind, ist eine Impfung gegen Pneumokokken ratsam (Booster nach 5 Jahren) [C].

S. 29, Kapitel 8.2.2

#### Alter Text:

Mehrfach Infektionen mit HCV sind möglich.

#### Neuer Text:

Mehrfach Infektionen mit unterschiedlichen HCV-Genotypen sind möglich.

„Interferon“ ersetzt durch „pegyliertes Interferon“

#### Ergänzt:

Abheilen einer Hepatitis C führt nicht zu einer Immunität für weitere HCV-Infektionen.